

Прием комбинации Мио-инозитол + Фолиевая кислота способствует восстановлению цикла у женщин с СПКЯ*




Г. Е. Чернуха и соавт.,
Акушерство и Гинекология, 10/2019

В исследование включены
140 женщин (средний возраст 26,4 лет) с СПКЯ

Тактика ведения женщин
Прием Фертины (1000 мг Мио-инозитола + 100 мкг Фолиевой кислоты)
по 4 пакетика 6 месяцев

Динамика изменений характера менструального цикла у пациенток с СПКЯ на фоне приема комбинации Мио-инозитола с Фолиевой кислотой



Результаты:

- Регулярный цикл менструаций восстановился
 - у **21,3%** женщин после **3 месяцев** приема
 - у **38,6%** женщин после **6 месяцев** приема
- Овуляция восстановилась у **78,6%** женщин, заинтересованных в беременности

В исследовании женщины принимали только Фертину



* Г.Е. Чернуха и соавт., АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ № 10 /2019, 144-151

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЛИСТКОМ-ВКЛАДЫШЕМ

RU.77.99.88.003.E.002116.05.18 от 25.05.2018

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ